



(株)日本農林社

特選 カタログ

キャベツ Cabbage

YCRふゆいろ

YCRきよまさ

ロイド

翔陽

目次

P1	根こぶ病抵抗性キャベツ特性一覧
P2-4	根こぶ病抵抗性品種各種
P5	寒玉キャベツ特性一覧
P6-13	寒玉キャベツ品種各種
P14	秋まき初夏どりキャベツ特性一覧
P15-17	秋まき初夏どりキャベツ品種各種
P18	春系キャベツ特性一覧
P19-22	春系キャベツ品種各種



一般社団法人

日本種苗協会

会員番号 13-025号

NORIN SEED
NIPPON NORIN SEED CO.

ノウリンの根こぶ病に強いキャベツ

根こぶ病抵抗性キャベツ特性一覧

品 種 名	熟 期	球 型	草 勢	肥大性	耐暑性	耐寒性	高冷地適性	オススメポイント
NEW YCRきよまさ	100日	甲高偏円	強	◎		◎		YCR品種の中では最も耐寒性に優れる
NEW YCRふゆいろ	90日	平玉	強	◎		○		球型が平玉に安定するため箱詰めしやすい
YCRこんごう	80～85日	甲高偏円	強	◎	○	○		肥大性に優れ、厚みのある球型で収量性が高い
YCRげっこう	70～75日	甲高偏円	中	○	○		○	YCR品種の中では早生性と耐暑性に優れる
Y C R 多 恵	70～75日	甲高偏円	中				○	平玉で揃いが良い
フルーツキャベツ	60～65日	甲高偏円	弱				○	早生で食味が良い


根こぶ畑で結果の出せる

◆ ノウリンの根こぶ病抵抗性キャベツ ◆

ノウリンの根こぶ病抵抗性(CR)キャベツは、薬剤処理せずに根こぶ病が出る圃場に作付けした場合、罹病しない、もしくは、罹病しても極軽微なこぶに抑えます。そのため根こぶ病による地上部の生育不良を起こすことなく、収穫をのぞむことができます。これまで根こぶ病で収穫不能になった圃場でも、キャベツの収穫が再開できるようになったと、多くの生産者様から高い評価をいただいております。

栽培事例

1



宮城県内陸部での「YCRげっこう」

【作型】

播種：3月下旬
定植：5月上旬
収穫：7月上旬～中旬

【結果】

罹病性品種は根こぶ病に罹病し結球前に収穫不能となった。YCRげっこうは根こぶ病の発生も見られたが地上部の生育に影響はなく、玉も肥大し無事収穫となった。

栽培事例

2



九州地区での「YCRきよまさ」

【作型】

播種：8月中旬
定植：9月中旬
収穫：1月中旬～2月上旬

【結果】

罹病性品種は根こぶ病に罹病し小玉で収穫不能となった。YCRきよまさはしっかりと肥大し加工用として収穫された。



日本で見ついている代表的な根こぶ菌を使用し検定試験を行っていますが、地域によっては他の菌系統により、根こぶの着生があるかも知れませんので、あらかじめご了承くださいませ。

ノウリン交配

90日 / 晩 生

新品種!
New根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

FVP 品種登録番号30599 / 海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)



HYB.YCR FUYUIRO

根こぶ病に非常に強く年内～1月収穫に向く

YCR
ふゆいろ

特 性

DNAマーカー選抜の利用により、複数の種類の根こぶ病に抵抗性を示す、市販品種で最高レベルの根こぶ病抵抗性品種

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性をそなえた定植90日程度で収穫になる寒玉種。
- 草勢は強く、玉伸びに優れており、形状は平玉で安定する。
- 「YCRこんごう」よりも晩生で、内部黒変症も発生しにくい。

栽培の注意

- 定植が遅れると玉の締まりが悪くなるので、適期に植えて下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	6	7	8	9	10	11	12	1	2
平 坦 地 (関東基準)		●	×				■		
		●	×				■		
暖 地		●	×	×			■		
		●	×				■		

ノウリン交配

100日 / 晩 生

新品種!
New根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

HYB.YCR KIYOMASA

根こぶ病に強く年明け収穫に向く寒玉種

C-135

YCR
きよまさ

特 性

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性をそなえた定植100日程度で収穫になる寒玉種。
- 草勢は強く肥大性も優れており、玉色は濃緑、形状は平玉で安定する。
- 「YCRこんごう」「YCRふゆいろ」よりも晩生で耐寒性に優れ、年明け収穫に向く。

栽培の注意

- 黒腐病の耐病性は中程度のため、必ず防除をおこなってください。
- 定植が遅れると玉の締まりが悪くなるので、適期に植えて下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	6	7	8	9	10	11	12	1	2
平 坦 地 (関東基準)		●	×				■		
		●	×				■		
暖 地		●	×	×			■		
		●	×				■		

※栽培記号の読み方 ●…タネまき ×…植えつけ(定植) ■…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配 70～75日 / 中 生

YCRげっこう(月光)

根こぶ病に強く年内収穫に向く

根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

HYB.YCR GEKKO


特 性

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性の為、従来の品種より薬剤の投与を抑え、より発生地での栽培が可能となっている。
- 定植後70～75日で収穫期に達する中生種。玉揃いが良いので圃場管理、収穫作業がしやすい。
- 外葉は濃緑色の丸葉系でやや大きめである。結球肥大型に属し、球型はやや腰高の扁円球。球は緑濃く球尻までよく着色する中玉種で、1球1.3～1.5kgに良く揃う。市場出荷に適している、高品質キャベツ。

栽培の注意

- 本種は、日本で見つかった代表的な根こぶ病菌の混合菌を使用し、幼苗検定を繰返し行い育成した根こぶ病抵抗性品種ですが、他にも菌の系統があり地域によっては根こぶの着生があるかもしれませんので、あらかじめ御了承下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配 80～85日 / 中 生

YCRこんごう(金剛)

根こぶ病に強く年内～年明け収穫向け

根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

HYB.YCR KONGO

特 性

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性を持った寒玉品種。
- 定植後80～85日程度で収穫できる中生種。
- 草勢が強く、栽培しやすい。重量は1.5～2.0kgで、しまりの良い結球肥大型。
- 球色は青緑色、球形は厚玉で重量感があり、玉伸びも良好。
- アントシアンの発生が少なく、裂球が遅いため1月収穫が可能。

栽培の注意

- 草勢が強いので、準高冷地、平坦地では肥培管理、栽植密度にご注意下さい。
- 日本で見つかった代表的な根こぶ病菌を使用し検定試験を行っていますが、地域によっては他の菌系統により、根こぶの着生があるかも知れませんので、あらかじめご了承ください。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ(定植) ー…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配 70～75日 / 中 生

YCR^{た え}多恵

つくりやすいノウリンの元祖YCR

根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

HYBR.YCR TAE


特 性

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性品種の為、従来の品種より薬剤の投与を抑え、発生地での栽培が可能となっている。
- 定植後70～75日で収穫期に達する中生種。玉揃いが良いので圃場管理、収穫作業がし易く市場出荷、産直に好評。
- 外葉は濃緑色の丸葉系でやや大きめである。結球肥大型に属し、球型はやや腰高の扁円球。球は緑濃く球尻までよく着色する中玉種で、1球1.3～1.5kgに良く揃う。

栽培の注意

- 本種は、日本で見つかっている代表的な根こぶ病菌の混合菌を使用し、幼苗検定を繰返し行い育成した根こぶ病抵抗性品種ですが、他にも菌の系統があり地域によっては根こぶの着生があるかもしれませんので、あらかじめ御了承下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき

×…植えつけ(定植)


—…収穫

上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配 60～65日 / 早 生

フルーツキャベツ

根こぶ病に強い甘くおいしい早生種

根こぶ病に強い
減農薬推進野菜

HYB.FRUIT CABBAGE


特 性

- 根こぶ病・萎黄病複合抵抗性品種。甘くて柔らかくジューシーなフルーツ感覚の産直向き早生種。
- 外葉は小さく草勢はおとなしい。玉の形状は甲高扁円球で1.1～1.3kg程度の良くしまった玉が収穫出来る。葉質は柔らかくみずみずしいので生食に向く。
- 夏蒔き栽培で定植後60～65日位の早生種。

栽培の注意

- 裂球がやや早いので適期収穫を心掛けて下さい。
- 初期生育が悪いと小玉になるので外葉を大きく作る肥培管理を行って下さい。
- 本種は、日本で見つかっている代表的な根こぶ病菌の混合菌を使用し、幼苗検定を繰返し行い育成した根こぶ病抵抗性品種ですが、他にも菌の系統があり地域によっては根こぶの着生があるかもしれませんので、あらかじめ御了承下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリンの寒玉キャベツ

寒玉キャベツ特性一覧

品 種 名	熟 期	草 勢	球 型	耐暑性	耐寒性	黒腐病 耐病性	生理 障害	高冷地 適性	春まき 適性	オススメポイント
 翔 陽	65日	やや 大人しい	平玉			○	◎	◎	◎	平玉で黒腐病と株腐病に強い
 ロ イ ド	75日	中	平玉		○	○	○	◎	◎	平玉で黒腐病に強く在圃性に優れる
天 陽	60日	中	甲高扁円	○			◎	○	◎	極早生品種で食味もよい
は や か ぜ	65日	中	甲高扁円	○		○	○			黒腐病に強い早生種
輝 吉	75日	中	平玉	○				◎	◎	安定感抜群の定番品種
早生藍宝つばさ	65日	中	平玉	○				○		YR藍宝よりも早生
Y R 藍 宝	70日	中	甲高扁円	○			○	○	○	病気に強く作りやすい
藍 宝 2 号	70日	やや強	甲高扁円	○			○		○	YR藍宝よりも草勢強く平玉
八 宝	70日	中	甲高扁円	○			○	○	◎	8玉サイズによく揃う
晩生藍宝ひかり	80~85日	強	甲高扁円	○	○					草勢強く肥大性抜群
円 楽	80日	中	甲高扁円		○		○		○	締まり抜群で重量感あり
N C - 7 6	120日	強	甲高扁円		◎		○			草勢強く肥大性と耐寒性に優れる
き よ は る	65日	強	平玉						◎	春作で早生性に優れる寒玉
トンガリボウシ	65日	中	尖り玉					○	○	食味最高の尖り玉品種
秋 み ど り	60~65日	中	平玉	○						耐暑性に優れる
ニューボール	60日	中	丸玉						○	作りやすいボール型キャベツ

定植後の生育日数表

◆ ノウリンの寒玉キャベツ ◆

60日	65日	70日	75日	80日~
早 生	中 早 生	中 生	中 生	中 晩 生
天 陽	翔 陽 きよはる はやかぜ 早生藍宝 つばさ	藍 宝 藍宝2号 八 宝	ロイド 輝 吉	円楽(80日) 晩生藍宝ひかり (80~85日)
				晩 生
				NC-76(120日)

ノウリン交配

75日 / 中 生

新品種!
New



HYB.LOYD

黒腐病に強く在圃性に優れる中生寒玉系

C-147

ロイド

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で定植後75日程度で収穫できる寒玉種。
- 黒腐病に強い。
- 在圃性に優れ、裂球が遅い。
- 草勢はややおとなしく、形状は平玉で安定する。
- 玉色は極濃緑色で、尻部の着色も良い。

栽培の注意

- 平坦地・暖地の夏まき早植え(8月上旬定植)作型は、小玉になるため、不向きです。
- 定植が遅れると結球が不十分になるので、適期に定植して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒・高冷地			●	✕			●	✕				
準高冷地			●	✕	●	✕						
平坦地 (関東基準)	●		✕	✕			●	✕				
暖 地	●	✕	✕				●	✕				

ノウリン交配

65日 / 中早生

新品種!
New



HYB.SHOYO

病気と生理障害に強い中早生寒玉系

C-120

しょう 陽 翔 陽

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で定植後65日程度で収穫できる寒玉種。
- 形状は、春まき栽培でも平玉で安定する。
- 草勢はコンパクトで密植栽培可能。
- 黒腐病や株腐病といった病気に強く、生理障害にも強いいため、栽培しやすい。

栽培の注意

- 高温期の収穫は在圃期間が短くなるため、注意する。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
寒・高冷地			●	✕			●	✕			
準高冷地			●	✕	●	✕					
平坦地 (関東基準)		●	✕	✕			●	✕			
暖 地	●	✕	✕				●	✕			

※栽培記号の読み方 ———— ●…タネまき ✕…植えつけ(定植) ———— 収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

60日/早 生

てん 陽
天 陽

早生性に優れ食味がよい良質系



HYB.TENYO

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で定植後60日程度で収穫できる良質系。特に初夏どりで早生性を発揮する。
- 形状は平玉で安定性にすぐれ、玉の締まりも良い。
- 肉質は良質系なので、青果および加工業務どちらにも対応しやすい。

栽培の注意

- ベト病の防除をしっかりとこなして下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒・高冷地		●		×			●	×		■		
平 坦 地 (関東基準)	●		×		×		■	●	×		■	
暖 地		×	●	×		■		●	×		■	●

ノウリン交配

65日/早 生

はやかせ

病気に強く良食味の良質系早生種



HYB.HAYAKAZE

特 性

- 萎黄病抵抗性で黒腐病にも強く、初秋収穫栽培でも栽培し易い。定植後60日～65日程度で収穫できる早生種。低温生育性もあり、生育日数が早いので遅蒔き早獲りも可能。
- 玉色は照りの有る緑色で、形状は厚みのある扁円球。肉質は寒玉寄りの良質系で、また在圃性もあるので青果及び加工業務のどちらにも対応しやすい。
- 草勢はややおとなしいが玉伸びも良く、当社「藍宝・輝吉」よりも7～10日早く出荷が可能。
- 平坦地・暖地の7月上旬中旬～8月上旬蒔きに適する。
寒・高冷地(標高1000m以上)の早播きは甲高傾向になりますので、5～6月播種をお勧めします。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒・高冷地					●	×		×		■		
平 坦 地 (関東基準)	●		×		×		■	●	×		■	
暖 地		×	●	×		■		●	×		■	●

※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ(定植) ■…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

65日 / 中早生

きよはる

初夏一番に重厚な平玉で仕上がる寒玉系




HYB.KIYOHARU

特 性

- 本品種の最大の特徴は、低温播種期～低温定植期でも頭部が丸玉になり難く、形状が安定した平玉に仕上がる事である。すなわち、各産地の最も早い早春定植で特徴を発揮する。
- 定植後65～70日程で収穫できる萎黄病複合抵抗性寒玉キャベツ。
- 草勢は強く開張性で、玉の肥大性が良好。重量は1.3～1.5kgで、良くしまり、しっかりと重量がのる。
- 玉色は緑色で、形状は扁平球の厚玉。尻部の着色も良好。葉肉は厚く、生食から加工まで幅広く使える。
- 地域、気候、土質に左右され難く、形状が安定している。
- 外葉がやや強く開張性なので、肥培管理に注意して下さい。また、収穫適期になっても玉が浮いて見えないので、収穫遅れに注意が必要です。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

75日 / 中 生

輝 吉

玉伸びの良さと良食味をそなえた定番人気種




HYB.TERUYOSHI

特 性

- 寒・高冷地から平坦地及び暖地まで幅広い適応性があり、球型は結球充実型の平玉で玉伸びが良く、非常に栽培し易い寒玉系品種。
- 萎黄病抵抗性で、耐暑性があり黒腐病に強く栽培し易い。
- 定植後75日位で収穫期に達する中生種。
- 外葉は濃緑色で、やや小さく半立性なので密植栽培が可能。
- 球色は青緑色。玉尻まで青く、球重1.3～1.5kgに非常に良く揃う。食味、品質共に抜群。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき

×…植えつけ(定植)

—…収穫

上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

65日 / 早 生

わ せ ら ん ぽ う

早生藍宝つばさ

「藍宝」より早く仕上がる早生寒玉系



HYB.WASERAMPO TSUBASA


特 性

- 定植後60～65日（は種後95日）で収穫期に達する早生品種。当社「YR藍宝」に比べて5日早く収穫が出来る。
- 平坦地、暖地の夏蒔き年内収穫に適し、春蒔き初夏収穫栽培も可能。
- 萎黄病抵抗性で、玉は偏円球で濃緑色の玉伸びが良い寒玉系。外葉はコンパクトなので密植栽培も可能。

栽培の注意

- 春蒔き栽培において無理な早蒔きは、玉型が乱れる（丸玉になる）可能性があるのを避けるようにして下さい。
- 平坦地の7月下旬以降のは種は「YR藍宝」、「藍宝2号」を推奨します。
- 黒腐病に対する強さは中程度なので、薬剤による防除は怠らないようにして下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

70日 / 中早生

ら ん ぽ う

YR藍宝

高い耐病性と適応性でつくりやすい定番人気種




HYB.YR RAMPO

特 性

- 寒・高冷地から平坦地及び暖地まで幅広い適応性で、非常に栽培し易い寒玉系品種。
- 外葉は青緑色の丸葉で密植が可能である。定植後65～70日で収穫出来る中早生種で、結球は結球肥大型に属す。
- 玉は濃緑で1.3～1.5kg位の中玉種である。球型はやや腰高の偏円球で輸送性に富み、耐暑、耐寒性があり、黒腐病及び軟腐病に強く、萎黄病に抵抗性がある。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方


●…タネまき ×…植えつけ(定植) —…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

70日 / 中早生

らん ぽう
藍宝2号

YR藍宝の平玉タイプ




HYB.RAMPO NO.2

特 性

- 従来の「YR藍宝」に比べて高温期でも甲高になり難く平玉になる。また低温伸張性があるので、秋収穫栽培においてもやや玉伸びし、安定した栽培が可能。
- 寒・高冷地から平坦地及び暖地まで幅広い適応性で、非常に栽培し易い寒玉系品種。
- 外葉は青緑色の丸葉で密植が可能である。定植後70日内外で収穫出来る中早生種で、結球肥大型に属す。
- 玉は濃緑で1.3～1.5kg位の中玉種である。球型はやや平玉で輸送性に富み、耐暑、耐寒性があり、黒腐病及び軟腐病に強く、萎黄病に抵抗性である。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒




ノウリン交配

70日 / 中早生

は っ ぽ う
八宝

8玉サイズで揃いよく仕上がる寒玉系



HYB.HAPPO


特 性

- 定植後65日～70日(中早生)程度で収穫出来る黒腐病にも強い萎黄病抵抗性寒玉系品種。
- 適度な玉伸びで8玉サイズ中心の大きさと良く揃うので、青果及び加工業務どちらにも対応出来る。
- 形状は甲高扁円球。草勢は当社の「輝吉」と比較してややおとなしい。

栽培の注意

- 寒・高冷地では、「輝吉」と同じ作型で栽培をお勧めします。早播きは甲高傾向になります。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方 — 〇…タネまき 〇…被覆栽培 ×…植えつけ(定植) —…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配 80～85日 / 中 生

ばん せい らん ぽう
晩生藍宝ひかり

玉伸び良く馬力があり年内収穫に向く



HYB.BANSEI RAMPO HIKARI


特 性

- 耐寒性、根張り、草勢が強く、産地適応性が広い栽培しやすい品種。
- 定植後80～85日で収穫となる寒玉系中生種。
- 萎黄病抵抗性で黒腐病にも強い。耐寒性が強く、低温伸張性も有るので、平坦地・暖地の冬期収穫が可能。
- 球・外葉共に濃緑色。形状はやや腰高の平玉。1.5～2kg以上になる豊産種。

栽培の注意

- 草勢が強いのでは種期、肥沃地の栽培や定植時の肥培管理（窒素過多）に注意して下さい。元肥重視の施肥設計の場合、初期生育は旺盛になりますが、生育中後期に肥料切れを起こし、玉伸びが悪い場合がありますので、追肥型の肥培管理を推奨します。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配 80日 / 中 生

え ん ら く
円 楽

低温伸長性と耐寒性がある年内～1月収穫向




HYB.ENRAKU

特 性

- 年内～1月収穫に適した玉締まりの非常によい寒玉キャベツ。
- 定植後80日で収穫となる萎黄病抵抗性品種。
- 「晩生藍宝ひかり」に比べてより耐寒性があり、12月以降の収穫でも葉の痛みや内部障害が少ない。
- 草姿はやや開張性で、草勢は比較的小さな。
- 形状は平玉に安定する。玉色は濃緑色で、尻までしっかりと青みが乗る。
- 在圃性があり、生食から加工まで幅広く使える。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方 — ●…タネまき ×…植えつけ(定植) — 収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

120日/晩 生



NC-76

低温伸長性に優れ冬期収穫に向く



HYB.NC-76


特 性

- 萎黄病抵抗性をそなえた定植後100～120日の晩生種。
- 草勢は強く肥大性に優れ、球色は濃緑で形状にやや厚みがあり、ボリュームのある玉に仕上がる。
- 低温伸長性に優れ、暖地の1～3月収穫に向く。

栽培の注意

- 黒腐病耐病性はないので、必ず防除をおこなって下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

65日/中早生

トンガリボウシ®

おいしくてサラダに最適なトンガリキャベツ




HYB.TONGARIBOSHI

特 性

- 葉肉が厚く、柔らかく、水分と甘味が非常に富んでいるので食味が良く、サラダや漬物(浅漬け)に最適な美味しい品種。また、球芯が短く球高に対して1/3～1/4程度の長さなので、調理がし易く無駄も少ない。
- 球頭部が尖る特徴があるので、リピーターの目印となり、有利な販売がし易く、直売や契約栽培に向く。
- 定植後65～70日で収穫期(1.3～1.5kg)に達するイオウ病抵抗性中早生種。
- 収穫の適期は結球葉に「葉割れ」が生じ始めた頃で、完熟させると更に美味しくなる。

規格: 5000粒(ペレット) / 100粒(ペレット) / 2500粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき

×…植えつけ(定植)

— …収穫


上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

60日 / 早 生

ニューボール

裂球が遅く、在圃期間の長いボール系




HYB. NEW BALL

特 性

- 外葉は濃緑色の丸葉で大きさは中程度。萎黄病抵抗性に黒腐病に強い。
- 湿害による根腐れにも強く、在圃期間の長い、栽培容易なボール系品種である。
- 玉の形状は丸型で、1.2～1.5kg程度の良くしまった重量感のある玉が収穫できる。裂球も遅く販売中心規格8玉に良く揃う。熟期は夏蒔きで定植後60日前後である。

規格: 5000粒 (ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

60～65日 / 早 生

秋みどり

柔らかくておいしい早生大玉




HYB. AKIMIDORI

特 性

- 定植後60～65日で収穫期に達する萎黄病抵抗性早生種。耐暑性にすぐれ、病気に強く栽培し易いので、高温期(平坦地9月下旬から10月上旬)の作型で特性を発揮する。球型は平玉で鮮緑色の為、見た目にも新鮮感がある。栽植密度によっては1個2kg以上になる玉伸びの良い品種。
- 葉はやや波葉で歯切れが良く柔らかい食味なので市場出荷の他に直売に向く。

規格: 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき

✕…植えつけ(定植)

—…収穫

上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリンの秋まき初夏どり寒玉系

秋まき初夏どりキャベツ特性一覧

品 種 名	早晩性	球型	草勢	在圃性	生理障害	おすすめポイント
 さつきいろ	中早生	甲高扁円	強	◎	◎	在圃性に優れ生理障害に強い
 NNS-C-91	早生	甲高扁円	強	○		早期定植することで早期収穫可能
こ と み	早生	甲高扁円	やや強	○		早生だが収量性にもすぐれる
さ つ き 王	早生	平玉	やや強			早期出荷重視タイプ
さつき女王	中早生	平玉	中	○	○	平玉に安定し在圃性に優れる

栽培のポイント

◆ ノウリンの秋まき初夏どりキャベツ ◆

とう立ちしにくい品種選びと、とう立ちしない大きさの苗で、越冬させるのがポイント!

秋まき年内定植の作型は、本来キャベツが抽苔(とう立ち)してしまう作型です。

抽苔を避けるため各品種や栽培地域によって定植時期が異なります。**特に早く収穫したい!と思って、早期定植した場合は、抽苔して収穫不能になる可能性があります。また、マルチやベタがけなどの保温資材は、越冬時の抽苔リスクを高めます。**定植時期をさらに遅らせるなど、小苗で越冬する工夫をおこなって下さい。

本カタログの作型表を参考に、初めて栽培される際は、お近くの種苗店やJA・または弊社までお問合せ下さい。

早めの追肥で生育をスムーズに、早めの防除で病害虫を抑えましょう!

この作型は生育前半が低温期のためキャベツの動きが鈍いですが、3月以降に急成長していきます。

動き出すタイミングで肥料が無いと生育が停滞してしまいます。暖かくなってキャベツが動き出す前に追肥を施しておくとその後の生育がスムーズとなります。

病害虫も生育前半は発生しにくいいため防除が遅れがちです。

収穫時期はベト病や株腐病、チョウ目害虫やアザミウマの被害が発生しやすい時期となります。

結球前からの早めの防除をお願いします。

適 作 型		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
寒・高冷地	ことみ・さつき王					●		×			■	
	さつき女王						●		×		■	
	さつきいろ									■		
平 坦 地 (関東基準)	さつき王	●	×			●	×			■		
	さつき女王									■		
	さつきいろ										■	
暖 地	ことみ		●	×		●	×			■		
	NNS-C-91	●	×						■			
	さつき王		●	×						■		
	さつき女王					●	×				■	
	さつきいろ											■
	ことみ		●	×		●	×			■		

ノウリン交配

秋まき可

新品種!
New



HYB.SATSUKI IRO



チップバーンに強い厚みある秋まき5月どり

C-146

さつきいろ

特 性

- 晩抽性で秋まき年内定植の作型でも栽培が可能な寒玉種。暖地5月、平坦地5～6月、北海道7月収穫に向く。
- チップバーン症状に強い。
- 草勢が強く、形状はやや厚みがあるため、業務加工用出荷に向く。

栽培の注意

- さつき女王よりも草勢が強い品種です。外葉が暴れるような場合は肥料を調整して下さい。
- 低温や乾燥のストレスでわき芽が発生する可能性があります。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
寒・高冷地					●		×		×		■
平坦地 (関東基準)	●	×			●	×			■	■	
暖地	●	×		●		×			■	■	

ノウリン交配

秋まき可

新品種!
New



(PVP) 品種登録番号28714 / 海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)

HYB.NNS-C-91



秋まきで春早期収穫できる寒玉系

NNS-C-91

NNS-C-91

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で、秋まき春早期収穫に向く寒玉種。
- 草勢は強く肥大性に優れており、業務加工に向く。
- 従来の弊社秋まき品種「さつき王」「さつき女王」よりも晩抽性に優れており、暖地で10月末～11月上旬に定植し、4月下旬～5月上旬の収穫も可能。

栽培の注意

- 12～2月の低温期は菌核病の防除をおこなってください。
- 栽培期間中の天候により、球内部にチップバーン症が発生する場合があります。
- 育成後半はベト病の防除を行なって下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	10	11	12	1	2	3	4	5	6
暖地	●	×						■	
西南暖地	●	×					■	■	

※栽培記号の読み方

●…タネまき

×…植えつけ(定植)

■…収穫


上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

秋まき可

ことみ

平坦地5月中旬出荷を目指す大玉タイプ



HYB.KOTOMI


特 性

- 11月上旬以降の播種で、5月中旬から収穫ができる中早生タイプ。「さつき女王」に比べて、1～2週間早く出荷が可能。
- 玉の形状は、やや甲高の扁円球。ややシワのある濃緑色で、葉肉は厚くやや硬めなので、業務加工にも向く。
- 外葉がコンパクトなので、密植栽培が可能。

栽培の注意

- 本種は弊社「さつき王」「さつき女王」に比べ、晩抽性が劣りますので、両品種よりも遅く播種しますようお願いいたします。(さつき王、さつき女王は平坦地で10/20以降の播種を推奨しています。)
- 収穫が遅くなると、やや芯伸びが早い為、適期収穫を心がけて下さい。
- 結球初期に肥料切れを起こすと、締まりが悪く花芽分化の原因になるので、肥料切れを起こさないようにご注意ください。
- 萎黄病抵抗性はないので、発生地での栽培は注意して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

秋まき可

さつき王^{おう}

平坦地5月中旬の早期出荷重視タイプ



HYB.SATSUKIO


特 性

- 10～11月蒔きで5～6月収穫ができる秋蒔き中早生タイプ。「さつき女王」に比べて1～2週間早く出荷が可能。
- 扁円球の寒玉タイプで、やや甲高。濃緑色で、加工業者様向けの契約栽培に最適。外葉は濃緑色の丸葉で開帳性。
- 従来の中早生系品種よりも秀品率が高い。

栽培の注意

- 本種は不抽苔性の安定した中早生種ですが、無理な早蒔きをして、この作型の栽培地における標準的な播種期及び定植期を厳守して下さい。
- 生育が早い分、収穫適期の巾が短く裂球が早いので、早めの収穫を心がけて下さい。
- 早出し出荷が主体の「さつき王」は、追肥主体の肥培管理を推奨します。
- 越冬栽培では風害による欠株が多くなりますので、子葉まで深く植え風害予防の為のネット被覆を推奨します。
- 萎黄病抵抗性はないので、発生地での栽培は注意して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ(定植) —…収穫
 上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

秋まき可

じょうおう

さつき女王

平坦地5月下旬出荷の在圃性収量重視



HYB.SATSUKIJOO

特 性

- 10～11月蒔きで5～6月収穫ができる秋蒔き中早生タイプ。在圃性が長く裂球が遅いので収量性は抜群。
- 寒玉タイプで扁平、ツヤのある緑色。加工業者様向けの契約栽培に最適。外葉はややシワがあり、立性で密植栽培が可能。
- 従来の中早生系品種よりも軟腐病や尻腐れに強く、秀品率が高い。

栽培の注意

- 不抽苔性の安定した中早生種も、無理な早蒔きを避け栽培地の作型の標準的な蒔期、定植期を厳守して下さい。
- 大玉収穫は元肥主体、早出し収穫は追肥主体の肥培します。
- 肥大期に乾燥するとブルーム発生場合があります。ツヤのある濃緑にするには、肥大期初期に窒素施肥(尿素など)が効果的。
- 越冬栽培では風害による欠株が多くなので、子葉まで深く植え風害予防のためのネット被覆を推奨します。
- 萎黄病抵抗性はなく、発生地での栽培は注意して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
寒・高冷地						●	●	●	●	●	●
平坦地 (関東基準)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ(定植) ■…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

最新品種は
Webサイトにて
随時更新!

カタログで更新しきれない最新の品種情報は、Webサイトにて随時更新中です。

弊社で力を入れております
根こぶ病に強いキャベツの
他、各品種情報や話題提供
などをまとめております。
あわせてご覧くださいませ。



株式会社日本農林社は、農業生産の最前線で求められる「強いタネ」の供給を目的に、育種から生産、販売までを一貫して行っている「野菜種子専門メーカー」です。
NORINブランドのタネは種苗店を通じて、日本各地でご活用いただいております。

商品情報 Seeds Information



NORINコラム NORIN Column



お知らせ News

2024年10月15日 最新品種の紹介について
2023年12月15日 最新品種の紹介について

その他 Other Links

日本農林社はこんな会社 1粒のタネから始まること
農業のあしたをつくろう NORINの採用情報
英語のご案内はこちら English version
日本種苗協会 代表理事 日本農林

© 日本農林社

Copyright © 2024 by Nippon Nohri Seed Co. All rights reserved.




ノウリンの春系キャベツ

春系キャベツ特性一覧

品 種 名	早晩性	球型	草勢	YR	黒腐病 耐病性	耐暑性	耐寒性	晩抽性	おすすめポイント
NEW YR春楽	70日	平玉	強	○		○		○	草勢強く作りやすい
NEW あおなみ (C-156)	120日～	甲高扁円	強	○	○		◎	◎	極濃緑色で耐寒性に優れる
はやかぜ	65日	甲高扁円	中	○	○	○			黒腐病に強い良質系タイプ
YRはま吉	70日	甲高扁円	中	○					食味が良い
YRうめ吉	90日	甲高扁円	やや強	○			○	○	萎黄病抵抗性のうめ吉タイプ
うめ吉	90日	甲高扁円	強				○	○	春系の中では菌核病に強い
はる吉	110日	甲高扁円	中				○	◎	晩抽性で食味が良い
YRまつ吉	120日	甲高扁円	強	○			○	◎	晩抽性と肥大性に優れる
藍春ゴールド	60日	丸玉	中						食味の良いサワーボール

リレー収穫イメージ(暖地)




年内収穫は黒腐病に強く耐暑性のある「はやかぜ」、草勢強く栽培しやすい「YR春楽」がオススメです。

1月～2月収穫は菌核病に強い「YRうめ吉」がオススメです。萎黄病抵抗性をもつため従来の「うめ吉」よりも播種期が長いです。

2月～3月収穫は「あおなみ」がオススメです。うめ吉よりも晩生で晩抽性と耐寒性に優れます。これまでにない極濃緑色の球色も「あおなみ」の特徴です。

ノウリン交配

70日 / 中早生

新品種!
New

HYB.CR SHUNRAKU



厳しい環境でもつくりやすい中早生春系

C-132

YR しゅん らく 春 楽

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で定植後70日程度で収穫できる春系。
- 弊社「うめ吉」よりも早生で球色は濃緑。形状は厚みのある平玉。
- 草勢強く、肥大性と在圃性に優れる。

栽培の注意

- 肥大性に優れるため、肥沃地での多肥栽培は避けて下さい。
- 1月以降の収穫では、地域によって凍害が発生するので、注意して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒・高冷地				●	×		●	×	—			
平 坦 地 (関東基準)	●		×	×		—	●	×	×		—	—
暖 地	●	×	×			—	●	×	×		—	—

ノウリン交配

120日 / 晩 生

新品種!
New

HYB.AONAMI



極濃緑色で耐寒性と晩抽性に優れた春系

C-156

あおなみ

特 性

- 萎黄病抵抗性品種で、暖地2～3月収穫に適した晩生の春系。
- 球色は極濃緑色で照りがあり、見栄えが良い。
- 形状は、厚みのある平玉となる。
- 耐寒性・晩抽性は「うめ吉」「YRうめ吉」より優れ、3月中下旬まで在圃可能。

栽培の注意

- 草勢が強いため、元肥重視の施肥設計の場合、初期生育が旺盛になり、玉が肥大しすぎる場合があります。追肥型の肥培管理を推奨します。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒

	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平 坦 地 (関東基準)	●	×				—		—	
暖 地		●	×	×				—	—

※栽培記号の読み方


●…タネまき ×…植えつけ(定植) —…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

90日 / 中晩生

うめ吉^{きち}

馬力・耐寒性が強く作り易い晩生春系



HYB. UMEKICHI


特 性

- 耐寒性、根張りが非常に強く、産地適応性が広い栽培し易い中晩生種。
- 春系産地で近年問題となっている菌核病に強く、収穫率の高い春系(サワー)品種。
- 暖地での栽培は8月中旬から9月上旬は種、9月上旬から定植。収穫は12月から3月(定植後80~120日)まで可能。
- 外葉は青緑色でブルームが少し有るが、球色は照りのある淡いグリーン。芯は短く、1.5kg程度の甲高球になる。

栽培の注意

- 草勢が強い為、元肥重視の施肥設計の場合、初期生育は旺盛になりますが、生育中後期に肥料切れを起こし、玉伸びが悪い場合がありますので、追肥型の肥培管理を推奨します。
- 萎黄病抵抗性はないので、発生地での栽培は注意して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒




ノウリン交配

90日 / 中晩生

YRうめ吉^{きち}

菌核病に強く早植えできる萎黄病抵抗性



HYB. YR UMEKICHI

特 性

- 萎黄病抵抗性をもった中晩生の春系。
- 「うめ吉」(萎黄病抵抗性なし)に比べ、早期定植、早期収穫の作型が可能になった。草勢はおとなしく、球高はやや低い。
- 「うめ吉」と同様に、菌核病に強く、収穫率が高い。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ(定植) —…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ノウリン交配

120日 / 晩 生

YRまつ吉^{きち}

極濃緑色で割れにくいYR春系



HYB.YR MATSUKICHI


特 性

- 萎黄病抵抗性の中晩性春系キャベツ。
- 草勢は強く、葉数が多い。球色は従来に無い極濃緑色タイプ。アントシアンの発生も少ない。
- 球形はやや甲高。裂球が遅く晩抽性の為、在圃性が良い。
- 玉伸びが良いので、肥沃地では栽植密度、肥培管理を考慮、注意する。

栽培の注意

- セルトレイ育苗の作型です。地床育苗は適宜調整して下さい。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



ノウリン交配

110日 / 晩 生

はる吉^{きち}

暖地2~3月収穫に向く良食味の春系



HYB.HARUKICHI


特 性

- 平坦地12~1月、暖地2~3月収穫に適した中晩生の春系。
- 球色は濃緑色で形状は平玉、重さは1.5kg程度。玉揃いも良い。
- 食味は良好であっさりとした味わい、生食から加工まで幅広く使える。
- 「うめ吉」「YRうめ吉」に比べ、草勢はおとなしく晩抽、在圃性も優れる。

栽培の注意

- 萎黄病抵抗性を持っていないので、発生地での栽培は注意が必要です。
- 苗床の消毒、暖地では9月中旬以降の定植がおすすめです。

規格: 5000粒(ペレット) / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方 — ●…タネまき ×…植えつけ(定植) — 収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。


ノウリン交配

70日 / 中 生

YRはま吉

きち

萎黄病抵抗性をもった年内収穫向け春系



HYB.YR HAMAKICHI


特 性

- 萎黄病抵抗性をもった、夏蒔き年内収穫向け春系品種（定植後、約70日）。
- 草勢が強く、大きくてボリュームのある玉を収穫する事ができる。また、湿害にも強く、つくり易い。
- 11月下旬～12月に当品種を出荷し、1～2月に「うめ吉」を出荷する事によりリレーが可能。

栽培の注意

- 春系（サワー）品種ですが、年内に結球させて出荷するタイプです。遅蒔きすると十分な結球を得られない場合がありますので、定植遅れにご注意下さい。

規格: 5000粒（ペレット） / 2500粒 / 100粒




ノウリン交配

60日 / 中早生

藍春ゴールド

らん しゅん

三季蒔きできるサワータイプの新丸型キャベツ



HYB.RANSHUN GOLD


特 性

- 外葉は濃緑色の丸葉で大きさは中型、立性で密植可能である。
- 夏蒔きで定植後65日内外で収穫期に達する中早生種で、結球後の裂球も遅い。
- 結球肥大大型に属し、玉は1.4kg内外の丸型で緑濃く新鮮味がある。
- 芯は低く良くしまり、葉質柔らかく甘味があり食味よい。

栽培の注意

- 萎黄病抵抗性はないので激発地での栽培は避けて下さい。
- 特に初期の生育を良くし外葉を作ることに心がけて下さい。

規格: 5000粒（ペレット） / 2500粒 / 100粒



※栽培記号の読み方

●…タネまき ×…植えつけ（定植） —…収穫
上記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

ACCESS 会社案内図



- JR埼京線「板橋」(東口)より徒歩10分
- 都営三田線「西巣鴨」(出口A3)より徒歩4分
- 都営バス(池袋～王子)「堀割」バス停より徒歩1分

株式会社 日本農林社

〒114-0023 東京都北区滝野川16-6-5
TEL:03-3916-3341 FAX:03-3916-3344
info@norin.co.jp https://www.norin.co.jp/



阿見研究開発センター

〒300-0323 茨城県稲敷郡阿見町大形字箕輪1669-3
TEL:029-889-0808 FAX:029-889-1358

地球を守ろう! 子供にやさしい環境を — 減農薬推進野菜 —

この品種は土壌殺菌剤の使用を低減させます

このマークは、野菜栽培における平均的な方法と比較して、環境に優しい栽培ができるタネに添付されています。つまり、病害虫に対して抵抗性や強い耐病性を備えており、従来の農法に比べて農薬の使用回数を減らして栽培できる品種の目印です。また、このマークは日本農林社の登録商標です。使用にはライセンス契約が必要となります。



ミックス
紙に責任ある森林
管理をえています
FSC® C004858



この印刷物は大豆油にかわり
米ぬか油を使用したライスイ
ンキで印刷しています。