


# キャベツ・ホウレンソウ標準作型

栽培記号の読み方 ●…タネまき ×…植えつけ(定植) ■…収穫  
下記の作型表を参考にして、各地域に適した栽培を行って下さい。

地域	品種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地	翔陽(しょうよう)		●		×								
	ロイド			●		×							
	YR春楽(しゅんらく)				●		×						
平坦地	翔陽(しょうよう)							●					
	ロイド	●		×									
	YCRきよまさ	●		×									
	YR春楽(しゅんらく)	●		×									
	さつきいろ				●		×						
暖地	翔陽(しょうよう)								●				
	ロイド	●		×									
	YCRきよまさ	●		×									
	YR春楽(しゅんらく)	●		×									
	さつきいろ				●		×						
高冷地	品種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地	バッハ			●					●				
平坦地	バッハ			●					●				
暖地	バッハ			●					●				

## 新発売



- キャベツ
- ロイド
  - YCRきよまさ
  - 翔陽(しょうよう)
  - さつきいろ
  - YR春楽(しゅんらく)
- ホウレンソウ
- バッハ



HYB.YCR KIYOMASA

HYB.BACH

未来のタネをつくろう Seeds for the Future

株式会社 **日本農林社**

〒114-0023 東京都北区滝野川6-6-5 TEL:03-3916-3341 FAX:03-3916-3344  
info@norin.co.jp https://www.norin.co.jp/



サイトをリニューアルしました。

# ノウリンの キャベツ & ホウレンソウ

Brand-New Cabbage and Spinach by Nippon Norin Seed Co.

株式会社 **日本農林社**

新発売

# ノウリンの「キャベツ」「ホウレンソウ」ご紹介



C-147

## ロイド



### 濃緑色で黒腐病に強い寒玉キャベツ

#### ここがオススメ

- ☑ 黒腐病に強い
- ☑ 球色は濃緑で尻部の着色も良い
- ☑ 形状は平玉に安定する

#### オススメ作型

- 平地・暖地の11月～12月収穫
- 高冷地の9月～10月収穫

#### 栽培のポイント

- ・平地・暖地の夏まき早植え作型(8月上旬定植)は小玉となるため向かない
- ・定植が遅れると結球不十分となるため注意する

YR/75日



HYB.LOYD

秋まき可



HYB.SATSUKIIRO

C-146

## さつきいろ



### 秋まき出来る加工向き寒玉キャベツ

#### ここがオススメ

- ☑ さつき女王の作型で栽培可能
- ☑ 生理障害の発生が少ない
- ☑ 在圃性に優れ収量性が高い

#### オススメ作型

- 平地の5月～6月収穫
- 暖地の5月収穫
- 北海道の7月収穫

#### 栽培のポイント

- ・梅雨入り以降の収穫では黒腐病や株腐病に注意する
- ・秋まき栽培では越冬時のストレスによって脇芽が発生することがある

C-135

## YCRきよまさ



### 年明け収穫のYCR寒玉キャベツ

#### ここがオススメ

- ☑ 根こぶ病・イオウ病複合抵抗性(YCR)品種
- ☑ 球色は濃緑で形状は平玉
- ☑ 草勢強く肥大性に優れる
- ☑ YCR金剛、YCRふゆいろよりも晩生

#### オススメ作型

- 暖地の1月～2月収穫
- 平地の12月～1月収穫

#### 栽培のポイント

- ・黒腐病の耐病性は中程度のため必ず防除をする
- ・定植が遅れると玉締まりが悪くなるため適期に定植する

YCR/100日



HYB.YCR KIYOMASA

YR/70日



HYB.CR SHUNRAKU

C-132

## YR春楽 (しゅんらく)



### 濃緑で栽培しやすい春系キャベツ

#### ここがオススメ

- ☑ 草勢強く栽培しやすい
- ☑ 球色は濃緑、形状はやや厚みのある平玉
- ☑ 在圃性に優れ裂球が遅い
- ☑ 夏まき・春まき可能

#### オススメ作型

- 暖地の12月収穫
- 暖地の5月収穫
- 高冷地の8月～10月収穫

#### 栽培のポイント

- ・肥大性に優れるため肥沃地での多肥栽培は避ける
- ・1月以降の収穫では地域によって凍害が発生するため注意する

C-120

## 翔陽 (しょうよう)



### コンパクトで病気に強い寒玉キャベツ

#### ここがオススメ

- ☑ 黒腐病や株腐病に強い
- ☑ 生理障害の発生が少ない
- ☑ 春まき栽培で形状が平玉に安定する
- ☑ 密植栽培可能

#### オススメ作型

- 高冷地の7月収穫
- 準高冷地の6月～7月収穫
- 暖地・平地の5月～6月収穫

#### 栽培のポイント

- ・高温期は在圃期間が短くなるため注意する
- ・草勢が大人しいため肥沃地での栽培に向く

YR/65日



HYB.SHOYO

春・秋 中生



HYB.BACH

Z-104

## バツハ



### 作業性・収量性に優れたホウレンソウ

#### ここがオススメ

- ☑ 作業性に優れる
- ☑ ポリュームある株で収量性に優れる
- ☑ 中生のため収穫に追われない
- ☑ ベト病レース1～15,17,19

#### オススメ作型

- 高冷地の5月～6月 および9月収穫
- 平地の4月～5月 および10月収穫

#### 栽培のポイント

- ・晩抽性はやや劣るため5月中旬～7月播種は避ける
- ・低温伸張性に劣るため春の早播きや秋の遅播きは避ける